



Santé

Les animaux en santé réduisent les frais de médicaments, de vétérinaire et la performance en engraissement.

Consulter un vétérinaire praticien pour l'élaboration de vos protocoles de soins préventifs et curatifs. Les veaux d'embouche engraisés en bouvillons à la ferme bénéficient de statuts sanitaire et vaccinal connus. En maintenant une bonne santé des animaux du début à la fin, la mortalité est limitée et le gain est maximisé. Les animaux performants en engraissement permettent de maximiser les revenus.

Protocole de traitement de groupe

La vaccination annuelle du troupeau reproducteur est fortement recommandée afin de :

- prévenir certains problèmes respiratoires
- prévenir un certain nombre d'avortements
- diminuer de façon considérable l'incidence de veaux immunotolérants

Vacciner avec un vaccin vivant atténué contre BRSV, BVD, IBR et PI3 et vermifuger les veaux au moins 15 jours avant le sevrage. Si vous utilisez des implants hormonaux et que vous prévoyez finir vos veaux, il est possible de procéder au même moment. Après avoir effectué ces actions, il est recommandé de retourner les veaux avec leurs mères pour 15 jours.

La pneumonie peut vite se répandre dans un lot ou un bâtiment. La détection et le traitement rapides permettent de réduire le risque de rechute. Le développement de maladies chroniques ou de résistance aux antibiotiques est donc réduit.

Le piétin et la **conjonctivite (Pink Eye)** sont des maladies fréquentes chez les bovins en parcs d'engraissement. Consulter votre vétérinaire pour déterminer **si et quand** la vaccination de votre troupeau est nécessaire pour chacune de ces maladies. Pour les animaux au pâturage, il est possible de devoir vacciner contre le charbon et le tétanos également.

Lorsque vous apportez des soins, utilisez des outils propres et en bon état. Évitez de contaminer vos bouteilles de médicaments en utilisant une aiguille souillée. Pour les vaccins, changez les aiguilles après un maximum de 10 injections.

Utilisation judicieuse des médicaments

Conserv

Débuter avec le **colostrum** maternel lorsque possible et s'assurer de fournir 100 g d'IgG lors du premier repas, soit 2 litres de colostrum dans les 2 premières heures de vie.

Les microbes qui causent la **diarrhée** infectent généralement les veaux par les voies orale ou ombilicale. La désinfection du nombril et le maintien d'un environnement propre et sec permettent de réduire l'incidence de diarrhée, d'arthrite, d'infections du nombril et de plusieurs autres maladies.



Reconnaitre les signes - Agir RAPIDEMENT. Effectuer au minimum 2 tournées des parcs par jour.

Dès l'apparition de comportements inhabituels (animal isolé, refus de s'alimenter, oreilles basses, etc.), il est nécessaire de prendre la température de l'animal avant toute intervention. Si un traitement est nécessaire, utiliser le dosage approprié en fonction du poids de l'animal. L'usage d'antibiotiques à dose curative est justifiée uniquement chez les veaux fiévreux (température supérieure à 39,5 – 40,0 °C). Les antibiotiques à action prolongée seront souvent prescrits par votre vétérinaire puisqu'ils nécessitent moins de manipulation

Il est essentiel que les vaccins soient administrés au bon moment afin de préparer le système immunitaire à certains pathogènes. Lorsque la vaccination est effectuée quelques semaines avant le sevrage, le système immunitaire est mieux préparé lors de cette période de stress et l'incidence de maladies est donc réduite.

Tous les vaccins devraient être injectés dans le cou. Les vaccins reconstitués doivent être administrés dans les 2 heures suivant la reconstitution et être réfrigérés jusqu'au moment de l'injection.



Références

Pour nous joindre : 450-679-0540

pbq@upa.qc.ca

Les Producteurs
de bovins du
Québec



Mars 2024



Santé

Les **implants** augmentent l'efficacité alimentaire et le gain moyen quotidien par la production de muscles tout en réduisant le dépôt de gras. Consulter un professionnel pour établir le protocole d'implantation qui correspond à vos objectifs de gain de poids, au sexe et à la race des veaux que vous engraissez, ainsi qu'à la composition de la ration.

Le premier implant devrait favoriser l'appétit des veaux et non l'augmentation rapide du gain. Pour un meilleur effet et pour rentabiliser au maximum les implants, respectez les durées d'implantation prévues et assurez-vous que la durée effective du dernier implant se termine près de la date d'abattage.

Les **produits suivants peuvent être utilisés** : Ralgro, Synovex S ou H1, Component E.S. ou E.H.1, Revalor G, Compudose ou leur équivalent. Les implants peuvent faire augmenter le gain moyen quotidien de 7 à 13 %, et ce, de façon économique. Ils sont particulièrement efficaces en finition. Une mauvaise utilisation des implants ou une alimentation inadéquate peuvent diminuer de façon significative l'effet attendu.



Les **ionophores** sont des additifs développés pour améliorer l'efficacité alimentaire et prévenir la coccidiose, mais peuvent également réduire l'acidose et le ballonnement. Les ionophores peuvent être toxiques à dosage élevé, assurez-vous de respecter la posologie.

Si vous utilisez une RTM, vous pouvez inclure 22 à 33 parties par million (ppm) d'ionophores, selon la prescription de votre vétérinaire puisqu'il s'agit d'un antibiotique. Les ionophores peuvent aussi être inclus dans le mélange de vitamines et minéraux ou dans le supplément afin de réduire le risque de surdosage.



L'**acidose** indique une baisse rapide du pH ruminal due à une surconsommation d'amidon ou de céréales et peut survenir lors d'un changement brusque dans le régime alimentaire.

Le **ballonnement** est l'accumulation de gaz due à la surconsommation de protéines ou d'amidon hautement digestibles. Chacun de ces troubles peut entraîner une baisse de la consommation et, dans les cas les plus graves, provoquer la mort.



Références

Pour nous joindre : 450-679-0540

pbq@upa.qc.ca

Un registre de traitements vétérinaires devrait contenir :

- Numéro d'identifiant Attestra
- Date de traitement
- Poids de l'animal
- Température de l'animal
- Produit utilisé et numéro de lot du produit
- Quantité administrée
- Raison du traitement
- Période de retrait du produit



Une **détection rapide et l'isolement des animaux malades, dans un parc hôpital, permettent de réduire la propagation de maladies dans le troupeau. Isoler les animaux blessés ou présentant une boiterie pourrait faciliter leur récupération. Les animaux provenant d'une autre ferme devraient être en quarantaine pour une période de 21 à 30 jours afin de limiter l'introduction de nouvelles maladies dans votre troupeau.**



Un animal peut sembler sain malgré qu'il soit infecté par des **parasites**. Le parasitisme entraîne une baisse des performances due à la perte d'énergie et de sang, à l'irritation de la peau et au stress.

Après une saison au pâturage, les veaux sont parasités à divers degrés. Un vermifuge de qualité doit être utilisé chaque année, soit à l'automne ou au printemps. Les avermectines sont à considérer pour :

- leur large spectre d'action
- leur facilité d'administration (solution à verser)
- leur coût raisonnable

Certaines situations pourraient toutefois justifier l'utilisation d'autres vermifuges que les avermectines. Les parasites doivent être contrôlés de façon à réduire l'impact sur le troupeau tout en limitant la résistance aux antiparasitaires par une rotation de traitement basée sur l'ingrédient actif. Consulter votre vétérinaire praticien pour plus d'information.



Les Producteurs
de bovins du
Québec

Mars 2024