

DÉVELOPPEMENT DE LA CORNE

Figure 1: durant les premières semaines qui suivent la naissance, le bourgeon cornual est flottant dans la peau.





Figure 2: au-delà de 3 mois d'âge, la corne en développement est en communication avec le sinus frontal.



Exigences du Code de pratiques

- Intervenir tôt, avant 3 mois d'âge, à l'aide d'outils appropriés et par des techniques reconnues.
- Obtenir les conseils de son vétérinaire sur les moyens et la pertinence du contrôle de la douleur.

Suggestion

Obtenir des conseils de son vétérinaire sur l'utilisation d'un analgésique et/ou d'une anesthésie locale particulièrement si l'ébourgeonnage est effectué après le premier mois d'âge.

Les Producteurs
de bovins du
Québec



L'écornage (ébourgeonnage)

Utilisation des bonnes méthodes au bon moment par du personnel compétent et avec les bons instruments



555, boul. Roland-Therrien, bureau 305
Longueuil (Québec) J4H 4G2
Téléphone: 450 679-0530
Télécopieur: 450 442-9348
pbq@upa.qc.ca • bovin.qc.ca

Les Producteurs
de bovins du
Québec



Cultivons l'avenir 2

Une initiative fédérale-provinciale-territoriale

Canada

Québec

Dans le but de favoriser le bien-être des animaux, le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins de boucherie comporte des exigences et des pratiques recommandées qui s'appliquent à l'écornage. Cette intervention très commune est susceptible de causer de la douleur et du stress aux bovins.

MÉTHODE RECOMMANDÉE

Ébourgeonnage thermique

Matériel à utiliser

Écorneur Rhinehart X30, Portasol, Steribud, Horn Stop, Buddex, HORN-UP S (certains sont électriques et d'autres fonctionnent au gaz).

Méthode

Bien maintenir la tête du veau.

Tondre le poil dans la région du bourgeon aidera à bien le repérer chez le très jeune veau et limitera l'encrassement du fer.

Appliquer l'instrument thermique seulement après qu'il ait atteint sa température maximale et effectuer une rotation d'un quart de tour dans les deux sens pour avoir un anneau de cautérisation uniforme. Le temps d'application varie selon l'instrument et l'âge du veau. Il se situe entre 10 et 20 secondes.

Vérifier la cautérisation



Anneau de cautérisation blanc continu à la suite de l'utilisation d'un instrument électrique ou au gaz chez un très jeune veau.



Anneau cuivré continu à la suite de l'utilisation du brûleur électrique traditionnel.



AUTRES MÉTHODES

Ébourgeonnage chimique

Matériel

Pâte caustique

Méthode

Appliquer sur le bourgeon cornal lorsque le veau est très jeune seulement, maximum 15 jours d'âge.

Si cette méthode est effectuée durant l'été, il y a un risque de mauvais ébourgeonnage et d'infection. En tout temps, il est difficile de s'assurer que toute la pâte demeurera en place suffisamment longtemps pour obtenir le résultat souhaité.

Ébourgeonnage chirurgical

Matériel

Douille, scalpel

Méthode

Retirer le bourgeon cornal avec la peau qui l'entoure immédiatement à la base.

Devrait être fait avant l'attachement du bourgeon de la corne, idéalement avant 2 mois d'âge.



MÉTHODE ALTERNATIVE

Écornage après l'âge de 3 mois

Le Circuit des encans spécialisés de veaux d'embouche retourne à la ferme les animaux qui présentent des signes d'infection à la suite de l'écornage. C'est pourquoi, il est fortement recommandé d'attendre au minimum 30 jours après l'écornage pour commercialiser les veaux d'embouche écornés après 3 mois d'âge.

Exigences du Code de pratiques

Utiliser un analgésique en consultation avec votre vétérinaire pour atténuer la douleur associée à l'écornage des veaux après l'attachement du bourgeon de la corne (veau âgé de 3 mois et plus).

Toutes les méthodes d'écornage effectuées après l'attachement du bourgeon provoquent beaucoup de douleur et de stress, des risques d'infection (sinusite), des risques d'hémorragie ainsi qu'une perte de productivité allongée.

Lorsqu'on se retrouve dans l'obligation d'écorner des veaux après l'âge de 3 mois, le personnel doit être formé à utiliser la bonne technique à l'aide des bons instruments et le contrôle de la douleur est obligatoire. En l'absence de personnel compétent, un vétérinaire devrait être consulté.

Référence

Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage. Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins de boucherie. 2013. www.nfacc.ca/francais

Les PBQ remercient D^{re} Marjolaine Rousseau, m.v., MS, Dipl. ACVS-LA, professeure adjointe à la Faculté de médecine vétérinaire, Saint-Hyacinthe, pour sa précieuse collaboration au contenu du dépliant.