

# La Boiterie : Une maladie fréquente dans les parcs d'engraissement.



La boiterie survient lorsqu'un animal a des **douleurs aux jambes ou aux pieds qui affectent sa façon de bouger**. C'est un problème de santé et de bien-être animal, ainsi qu'un problème de production. La douleur due à la boiterie limite souvent la croissance car les animaux peuvent être réticents à manger ou à boire.

Il existe de nombreux types de boiterie, avec plusieurs causes différentes, dont beaucoup sont interdépendantes. La boiterie peut être causée par la **génétique**, l'**environnement**, la **nutrition**, une **blessure** ou une **infection**.

## Causes et types de boiterie

Les trois causes les plus courantes de boiterie comprennent :

1. **Infection** (c.-à-d. piétin, dermatite digitale, nécrose du bout des orteils, arthrite infectieuse)
2. **Nutrition** (c.-à-d. fourbure, nécrose liée aux mycotoxines)
3. **Blessure physique** (c.-à-d. gelure, entorse, fracture)

Chacun de ces types de boiterie est associé à des facteurs de risque spécifiques. Les **traumatismes ou les conditions humides** qui affectent l'intégrité de la peau ou des sabots peuvent provoquer directement la boiterie et également fournir une voie aux bactéries pour pénétrer et coloniser une plaie.

## Pratiques préventives

Il existe des pratiques de gestion des installations, de la santé et du comportement que les producteurs peuvent utiliser pour **aider à réduire** la boiterie, notamment :

- **Nettoyage régulier** des enclos;
- **Enlever les objets tranchants**, comme les pierres, le fil ou le métal;
- Pratiquer la **manipulation** d'animaux **sans stress**;
- Appliquer de la **chaux sur les planchers de la grange** après le nettoyage entre les remplissages;
- Consulter votre **vétérinaire**;
- Planifier des **programmes alimentaires**;
- **Tester les aliments** pour les mycotoxines potentielles.



Scannez le code ou cliquez [ici](#) pour lire et télécharger la fiche technique complète.

