


Planter sans compromettre le persillage

Avant d'implanter, déterminer les facteurs suivants :

- Sexe
- Poids à l'abattage
- Alimentation
- Durée de l'engraissement


Déterminer **les objectifs de production** recherchés :

1. Gain moyen quotidien (GMQ)
2. Persillage
3. GMQ + persillage



*Relatif au graphique à la page 2

Planter sans compromettre le persillage : ce que dit la science...



*Résumé de 325 études publiées sur l'implantation des bouvillons et des génisses a été comparé à un contrôle négatif ¹

- **Bouvillons** : Les implants de TBA à faible dose ont un impact limité sur le persillage comparé aux implants plus puissants
- **Génisses** : Les implants de TBA ont un impact négligeable sur le persillage



3 POINTS À RETENIR...

Le **succès d'une implantation** dépend :

- Alimentation adéquate
- Calendrier d'implantation bien conçu
- Bonne technique d'implantation

Le **moment de la pose** du dernier implant par rapport à l'abattage est crucial.

Une **gestion réfléchie** des implants est essentielle pour maximiser le persillage tout en optimisant la croissance.

Sources :

1. <https://www.wrightsfeeds.ca/wp-content/uploads/Managing-and-Feeding-for-Marbling-and-Carcass-Quality-in-Beef-Cattle.pdf>
2. <https://www.agrireseau.net/bovinsboucherie/Documents/bb360.pdf>
3. <https://www.agrireseau.net/bovinsboucherie/Documents/22-IMPLANTS.htm>

Les Producteurs
de bovins du
Québec

