

Tableau des implants homologués au Canada*

| Implant | Sexe | Ingrédient actif | Période effective | Distributeur |
|-----------------------------|------|---|-------------------|---------------------|
| Component E-C avec Tylan | ♂ ♀ | Œstradiol (10 mg), progestérone (100 mg) et tartrate de tylosine (29 mg) | 70 - 100 jours | Elanco |
| Component E-S avec Tylan | ♂ | Benzoate d'œstradiol (20 mg), progestérone (200 mg) et tartrate de tylosine (29 mg) | 70 - 100 jours | Elanco |
| Component E-H avec Tylan | ♀ | Benzoate d'œstradiol (20 mg), propionate de testostérone (200 mg) et tartrate de tylosine (29 mg) | 70 - 100 jours | Elanco |
| Component TE-G avec Tylan | ♂ | Œstradiol (8 mg), acétate de trenbolone (40 mg) et tartrate de tylosine (29 mg) | 60 - 90 jours | Elanco |
| Component TE-100 avec Tylan | ♂ ♀ | Œstradiol (10 mg), acétate de trenbolone (100 mg) et tartrate de tylosine (29 mg) | 70 - 100 jours | Elanco |
| Component TE-S avec Tylan | ♂ ♀ | Œstradiol (24 mg), acétate de trenbolone (120 mg) et tartrate de tylosine (29 mg) | 70 - 100 jours | Elanco |
| Component TE-H avec Tylan | ♀ | Œstradiol (14 mg), acétate de trenbolone (140 mg) et tartrate de tylosine (29 mg) | 70 - 100 jours | Elanco |
| Component TE-200 avec Tylan | ♂ ♀ | Œstradiol (20 mg), acétate de trenbolone (200 mg) et tartrate de tylosine (29 mg) | 80 - 100 jours | Elanco |
| Compudose | ♂ ♀ | Œstradiol (25,7 mg) | 170 - 200 jours | Elanco |
| Ralgro | ♂ ♀ | Zéranol (36 mg) | 70 - 100 jours | Merck Santé animale |
| Revalor-G | ♂ | Acétate de trenbolone (40 mg) et œstradiol (8 mg) | 60 - 90 jours | Merck Santé animale |
| Revalor-100 | ♂ ♀ | Acétate de trenbolone (100 mg) et œstradiol (10 mg) | 120 jours | Merck Santé animale |
| Revalor-S | ♂ | Acétate de trenbolone (120 mg) et œstradiol (24 mg) | 130 jours | Merck Santé animale |
| Revalor-H | ♀ | Acétate de trenbolone (140 mg) et œstradiol (14 mg) | 130 jours | Merck Santé animale |
| Revalor-200 | ♂ ♀ | Acétate de trenbolone (200 mg) et œstradiol (20 mg) | 140 jours | Merck Santé animale |
| Revalor-XR | ♂ ♀ | Acétate de trenbolone (200 mg) et œstradiol (20 mg) | 130 - 200 jours | Merck Santé animale |
| Revalor-XH | ♀ | Acétate de trenbolone (200 mg) et œstradiol (20 mg) | 130 - 200 jours | Merck Santé animale |
| Revalor-XS | ♂ | Acétate de trenbolone (200 mg) et œstradiol (40 mg) | 130 - 200 jours | Merck Santé animale |
| Synovex C | ♂ ♀ | Progestérone (100 mg) et benzoate d'œstradiol (10 mg) | 60 - 90 jours | Zoetis |
| Synovex Choice | ♂ ♀ | Acétate de trenbolone (100 mg) et benzoate d'œstradiol (14 mg) | 70 - 100 jours | Zoetis |
| Synovex H | ♀ | Benzoate d'œstradiol (20 mg) et propionate de testostérone (200 mg) | 70 - 100 jours | Zoetis |
| Synovex LA-F | ♂ ♀ | Acétate de trenbolone (200 mg) et benzoate d'œstradiol (28 mg) | 150 - 200 jours | Zoetis |
| Synovex LA-G | ♂ ♀ | Acétate de trenbolone (150 mg) et benzoate d'œstradiol (21 mg) | 150 - 200 jours | Zoetis |
| Synovex S | ♂ | Progestérone (200 mg) et benzoate d'œstradiol (20 mg) | 70 - 100 jours | Zoetis |
| Synovex Plus | ♂ ♀ | Acétate de trenbolone (200 mg) et benzoate d'œstradiol (28 mg) | 70 - 110 jours | Zoetis |
| Synovex Primer | ♂ ♀ | Acétate de trenbolone (50 mg) et benzoate d'œstradiol (7 mg) | 70 - 100 jours | Zoetis |

*Ce tableau est un outil servant à **guider vos réflexions**, mais **ne doit pas être considéré comme une recommandation**. Veuillez **consulter votre vétérinaire** afin d'élaborer une stratégie d'implantation adaptée à vos besoins et à votre entreprise. Plusieurs facteurs peuvent influencer votre stratégie d'implantation.

Légende : ♂ Mâle ♀ Femelle